

带状疱疹の各ワクチンと助成額比較表

(R6.3 作成参考資料)

带状疱疹予防接種は任意接種です。ワクチンの効果や副反応、接種費用等を参考にどちらのワクチンの助成を申請されるかご判断ください。特に基礎疾患のある方は主治医とご相談のうえで接種するワクチンをご選択ください

ワクチンの種類	生ワクチン (乾燥弱毒性水痘ワクチン)	不活化ワクチン (乾燥組換え带状疱疹ワクチン)
販売名	ビケン	シングリックス
助成回数	1回限り	2回まで
助成額(1回)	3,000円	6,000円
予防効果	50歳代 93.8% 60歳代 91.6% 70歳代 78.6% 带状疱疹ウイルスに対する細胞性免疫が上昇した。	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8% 带状疱疹に対する有効性。
持続期間	約5年 ※1	約10年 ※2
接種方法	皮下接種 1回	筋肉内接種 2回(2か月の間隔をおいて2回)
副反応	発現割合は50.6% 接種部位の反応50.6% (発赤44.0%、そう痒感27.4%、熱感、腫脹、疼痛、硬結) 全身反応3.9%	接種部位の疼痛79.1%、発赤37.4%、腫脹24.2%。頭痛28.3%、筋肉痛36.9%、疲労34.6%、悪寒21.4%。 重大な副反応としてショック、アナフィラキシー反応も含む過敏症状が現れることがある。(頻度不明)
接種できない方	明らかに免疫機能に異常のある病気のある方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方。	

- ・ 予防接種ガイドライ 2023年度版、各ワクチン添付文書より一部抜粋。一部改変。
- ・ ※1 ビケン 医薬品インタビューフォームより
- ・ ※2 シングリックス筋注用冊子 ZOSTER 試験より